



MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Malgré de récentes améliorations relevées dans certains pays, la surveillance épidémiologique dans cette région reste limitée (Obermeyer, 2006). Toutefois, en se fondant sur l'information disponible concernant le VIH, on estime que 35 000 [16 000–65 000] personnes ont contracté le VIH en 2007, ce qui porte à 380 000 [270 000–500 000] le nombre total de personnes vivant avec le VIH dans la région. Quelque 25 000 [20 000–34 000] personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2007.

Le nombre de cas de VIH notifiés dans la région reste modeste. La plupart des infections à VIH se produisent chez des hommes et dans les zones urbaines, à l'exception du **Soudan**, pays qui connaît la plus forte prévalence de la région et où les rapports hétérosexuels non protégés constituent le plus important facteur de risque d'infection à VIH.

Si les rapports sexuels tarifés non protégés sont un facteur clé des épidémies de VIH dans l'ensemble de la région, l'exposition à du matériel d'injection de drogues contaminé est la principale voie de transmission en **Afghanistan**, en **République islamique d'Iran**, en **Jamahiriya arabe libyenne** et en **Tunisie** et elle contribue aussi aux épidémies de l'**Algérie**, du **Maroc** et de la **République arabe syrienne**.